

Тестовое задание
по МДК 02.08 «Оказание узкоспециализированной сестринской помощи.
Раздел: Сестринский уход в гериатрии для обучающихся по специальности: 34.02.01
Сестринское дело
по теме практического занятия № 2: Гериатрические аспекты в кардиологии

Инструкция: выберите из всех предложенных вариантов ответов правильные.

031. Какие из перечисленных препаратов не относятся к ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента?
- а) изоптин (верапамил, финоптин)
 - б) аналаприл (ренитек, вазотек, энап)
 - в) цилазаприл (инхибейс)
 - г) капотен
 - д) ловастатин
032. Для купирования приступа мерцательной аритмии у больных с синдромом WPW противопоказано введение
- а) кордарона
 - б) новокаиамида
 - в) верапамила
 - г) сердечных гликозидов
033. Какие уровни АД соответствуют пограничной артериальной гипертензии?
- а) 140/85-159/90 мм рт. ст.
 - б) диастолическое АД 95-104 мм рт. ст.
 - в) диастолическое АД 105-114 мм рт. ст.
 - г) систолическое АД >160, диастолическое АД не более 90 мм рт. ст.
 - д) диастолическое АД >105 мм рт. ст.
034. Из перечисленных β -блокаторов кардиоселективным (β_1 -селективным) действием обладают
- а) пропранолол (обзидан, индерал, анаприлин)
 - б) атенолол (тенормин)
 - в) метопролол (беталок, спесикор)
 - г) талинолол (корданум)
 - д) окспренолол (тразикор)
 - е) пиндолол (вискен)
 - ж) тимолол
 - з) ацебутолол (сектраль)
 - и) надолол (коргард)
035. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента обладают следующими эффектами
- а) симпатолитическим действием
 - б) вазодилатирующим действием
 - в) блокирует задержку натрия и воды
 - г) все перечисленное верно
036. Стимуляция β -адреноблокаторов вызывает все перечисленные эффекты, за исключением
- а) ускорения СОЭ
 - б) усиления сократимости миокарда
 - в) расширения артерий и артериол
 - г) ускорения проведения импульсов в сердце
037. β -блокаторы оказывают положительное действие при всех нижеперечисленных заболеваниях, за исключением
- а) гипертрофической кардиомиопатии
 - б) митрального стеноза
 - в) поражения периферических артерий
 - г) тиреотоксикоза
038. Вазодилататором, действующим преимущественно на артериолы, является
- а) нитроглицерин
 - б) каптоприл
 - в) апрессин

- г) празозин
 - д) нитропруссид натрия
039. Развитие толерантности наиболее часто отмечается при приеме
- а) верапамила
 - б) дилтиазема
 - в) нитросорбита
 - г) капотена
 - д) эналаприла
040. Показаниями для назначения вазодилататоров являются все нижеперечисленные заболевания, за исключением
- а) артериальной гипертензии
 - б) дефекта межжелудочковой перегородки
 - в) недостаточности аортального клапана
 - г) стеноза устья аорты
 - д) дилатационной кардиомиопатии
041. Максимальное замедление внутрижелудочковой проводимости отмечается при назначении
- а) хинидина
 - б) мексилетина
 - в) кордарона
 - г) этацизина
 - д) анаприлина

