

28.03.2020г

группа 203 ,2бригада,

Задания по фтизиатрии, практические занятия

1)Скачать презентацию(туберкулез и туберкулинодиагностика) на свой компьютер, ноутбук,планшет и.т.д. во вложений. Открыть презентацию. Изучить внимательно каждый слайд.

2)По усвоению материала тесты для студентов и ответить на них. Ответы можно подчеркнуть прямо в документе жирной линией черного цвета(ответов на каждый вопрос может быть несколько).

3)Ответы необходимо присылать с фамилией и инициалами на эл.почту: alexeyashnikov@mail.ru

4) roftb.ru материалы для самостоятельного изучения. На сайте найдите клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза. Выучите основные противотуберкулезные препараты.

1. Туберкулин - это:

А) фильтрат убитой паром 6-8-недельной культуры МБТ; Б) культура патогенных МБТ; В) живая ослабленная культура МБТ; Г) гомогенизированная очищенная культура авирулентных МБТ; Д) смесь различных штаммов МБТ.

2. Туберкулин был получен: А) Кальметтом в 1919 г.;

б) Пирке в 1907 г.;

в) Гоном в 1912 г.;

г) Кохом в 1890 г.;

Д) Форланини в 1892 г.

3. Положительная туберкулиновая реакция после предшествующей отрицательной, проведенной не позднее 12 мес назад, у детей и подростков называется:

А) гипоергией; Б) пассажем;

В) виражом; Г) анергией; Д) гиперергией.

4. В 0,1 мл стандартного препарата ППД-Л содержится туберкулиновых единиц (ТЕ) в количестве:

А) 2; Б) 5;

В) 10; Г) 20;

Д) 100.

5. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л ставится вакцинированным БЦЖ детям и подросткам:

А) 1 раз в год; Б) 2 раза в год;

В) 1 раз в 2 года; Г) 1 раз в 3 года;

Д) 1 раз в год с 7-летнего возраста.

6. Для постановки пробы Манту необходима доза туберкулина в количестве туберкулиновых единиц (ТЕ):

А) 1;

Б) 2; В) 5; Г) 20;

Д) 100.

7. При постановке пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л туберкулин вводится:

А) интратрахеально; Б) подкожно;

В) внутрикожно; Г) внутривенно; Д) наочно.

8. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л читается через:

А) 30 мин; Б) 6-12 ч;

В) 12-24 ч; Г) 48-72 ч;

Д) 2-3 нед.

9. Противопоказанием для постановки пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л является:

А) наличие прививки БЦЖ в течение последнего года; Б) инфекционное заболевание;

В) предшествующая положительная реакция на туберкулин; Г) предшествующая отрицательная реакция на туберкулин; Д) подозрение на инфицирование МБТ.

10. При постановке пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л у человека развивается реакция:

А) уколочная (местная); Б) общая;

В) очаговая;

Г) уколочная и общая; Д) уколочная и очаговая.

11. Отрицательная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л:

А) свидетельствует об инфицировании МБТ;

Б) свидетельствует о послевакциальной аллергии;

В) требует назначения с профилактической целью противотуберкулезных препаратов;

Г) наблюдается при иммунодефицитных состояниях (ВИЧ-инфекция);

Д) является абсолютным признаком инфекционной аллергии.

12. У вакцинированных вакциной БЦЖ детей ответная реакция на введение аллергена туберкулезного рекомбинантного ДИАСКИНТЕСТА® должна быть:

А) гиперергической;

Б) выраженной положительной;

В) умеренно выраженной положительной; Г) сомнительной;

Д) отрицательной.

13. Противотуберкулезная вакцинация и ревакцинация БЦЖ - это

1) неспецифическая профилактика туберкулеза

2) специфическая профилактика туберкулеза

3) мероприятия, которые иногда предупреждают туберкулез

14. Препарат, которым проводится вакцинация и ревакцинация БЦЖ, - это

1) вакцина ППД-Л

2) альтотуберкулин Коха

3) вакцина БЦЖ

4) стандартный туберкулин

15. Вакцина БЦЖ - это

1) живые МБТ

2) убитые МБТ

3) живые, но ослабленные микобактерии вакцинного штамма

16)Вакцина БЦЖ

- 1)должна обладать иммуногенностью
- 2)должна быть стабильна при хранении
- 3)должна быть авирулентной
- 4)соответствовать всем перечисленным требованиям

17)Оптимальной температурой режима хранения вакцины БЦЖ

- 1)+20°C
- 2) +2°C
- 3) + 4°C

18)Вакцины БЦЖ вводятся

- 1)внутри и интраназально
- 2)внутримышечно
- 3)накожно
- 4)подкожно
- 5)внутрикожно

19)Место введения вакцины БЦЖ

- 1)подлопаточная область
- 2)область живота
- 3)верхняя треть плеча

20)После правильно проведенной вакцинации и ревакцинации БЦЖ на коже остается

- 1)пятно
- 2)рубец
- 3)звездчатый рубец
- 4)келлоидный рубец

21)Оптимальный размер рубца

- 1)1-3 мм
- 2)3-5 мм
- 3)5-8 мм
- 4)8-10 мм
- 5)10-15 мм

22)Вакцинация БЦЖ проводится

- 1)детям 1-14 лет
- 2)новорожденным
- 3)подросткам 15-17 лет

23)Ревакцинация БЦЖ проводится всем перечисленным, кроме

- 1)новорожденных
- 2)детей
- 3)подростков
- 4)взрослых

24)Вакцинация БЦЖ проводится

- 1)в роддоме
- 2)в детском саду
- 3)в поликлинике

25)Вакцинация БЦЖ недоношенным детям проводится

- 1)в детском саду

2)в поликлинике

3)в школе

4)в роддоме

26)Ревакцинация БЦЖ детям проводится

1)в роддоме

2)в школе

3)в диспансере

4)в детском саду

27)Ревакцинация БЦЖ подросткам осуществляется

1)в диспансере

2)в школе (техникуме)

3)в поликлинике

4)в больнице

28)Вакцинация БЦЖ проводится

1)постовой медсестрой

2)врачом-педиатром

3)фтизиопедиатром

4)специально обученной медсестрой (вакцинатором)

29)Вакцинация БЦЖ здоровых новорожденных проводится

1)на 5-7-й день жизни

2)на 1-е сутки жизни

3)на 4-е сутки жизни

4)на 10-12-й день жизни

5)на 1-м месяце жизни

30)Ревакцинация БЦЖ обусловлена

1)угасанием иммунитета после вакцинации

2)наличием контакта с больным туберкулезом

3)отсутствием послевакцинального знака

31)Декретированными возрастaми для проведения ревакцинации БЦЖ являются все перечисленные, кроме

1)детей до 5 лет

2)детей 5-7 лет

3)детей 8-9 лет

4)детей и подростков 10-17 лет

32)Основное показание к проведению ревакцинации БЦЖ - это

1)положительная реакция Манту с 2 ТЕ

2)отрицательная реакция Манту с 2 ТЕ

3)сомнительная реакция Манту с 2 ТЕ

4)контакт с больным туберкулезом

33)Основными противопоказаниями к проведению ревакцинации БЦЖ являются

1)остаточные изменения ранее перенесенного туберкулеза

2)серьезные хронические соматические заболевания

3)аллергозы

4)все перечисленное

34)Отличие вакцины БЦЖ от БЦЖ-М

1) в дозе препарата

2) в количестве живых микробных тел 3) при приготовлении вакцины

35) Вакцина БЦЖ-М применяется

1) у недоношенных детей

2) у ослабленных детей

3) у детей с иммунодефицитом

36) Длительность хранения открытой вакцины БЦЖ должна быть не более

1) 3 часов

2) 5 часов

3) 8 часов

4) одних суток

37) Послевакцинальный знак формируется

1) на 3-м месяце

2) на 6-м месяце

2) к 1-му году

3) к 2-му году

38) При проведении у детей вакцинации БЦЖ необходима предварительная постановка реакции Манту с 2 ТЕ, начиная

1) с 1-го месяца жизни

2) с 2-го месяца жизни

3) с 3-го месяца жизни

4) с 6-го месяца жизни

39) Ревакцинация БЦЖ проводится

1) при сомнительной реакции Манту с 2 ТЕ

2) при положительной реакции Манту с 2 ТЕ

3) при отрицательной реакции Манту с 2 ТЕ

40) Положительной считается реакция Манту с 2 ТЕ, если размер инфильтрата составляет

1) 1-2 мм

2) 3-4 мм

3) 5-10 мм

41) Доза вакцины БЦЖ, вводимая внутрикожно, составляет

1) 0.025 мл

2) 0.05 мл

3) 0.1 мл

4) 1.0 мл

42) После вакцинации БЦЖ при наличии в семье больного туберкулезом ребенок изолируется

1) на 1 месяц

2) на 2 месяца

3) на 5 месяцев

4) на 1 год

43) Послевакцинальный иммунитет формируется в течение

1) 2 лет

2) 1 года

3)5 лет